

Un passage de strip till à l'automne vise à réaliser un travail motteux qui pourra évoluer durant l'hiver.



Strip-till Une technique efficace sur maïs si elle est bien positionnée

Comme toute technique de travail du sol simplifié, le strip-till requiert certaines précautions d'usage. Après deux ans d'expérimentation sur trois sites, ARVALIS – Institut du végétal montre que le positionnement d'un strip-till et le réglage de la machine sont déterminants pour la réussite du maïs.

A l'image de la grande majorité des cultures de printemps, le maïs est souvent implanté après un labour. Seuls 20 % environ de la sole ne sont pas dans ce cas, selon l'enquête sur les pratiques culturales publiée par le ministère de l'Agriculture en 2006. Aux côtés de plusieurs centaines d'outils en service, le strip-till représente une nouvelle solution de simplification mais il requiert un minimum de maîtrise technique. Son efficacité à préparer une ligne de semis propre et meuble repose sur une bonne anticipation du passage et un bon réglage du matériel. Ce sont les

principaux enseignements des premiers essais réalisés par ARVALIS – Institut du végétal sur le sujet.

Trois sites, trois systèmes de culture

Trois sites ont accueilli ces expérimentations : Lyon St-Exupéry dans le Rhône dès 2010, Gollainville dans le Loiret et la Jaillière en Loire-Atlantique à partir de 2011. Au moins trois techniques d'implantation ont été comparées à chaque fois : labour, sans labour classique selon les techniques simplifiées représentatives de la région et strip-till. Ce dernier s'est appuyé sur

plusieurs machines selon les années (Orthman, Kuhn, Stripcat...). Seul le site de Gollainville a permis de comparer trois strip-tillers deux ans de suite (*encadré*).

Chaque site se distingue également par son système de culture et son type de sol. À Lyon, il s'agit d'une monoculture de maïs irrigué conduite sur un sol très léger et caillouteux (type alluvions). À Gollainville, un sol intermédiaire de limons argileux (avec 25 % d'argile) accueille une rotation céréalière intégrant des betteraves sucrières et du maïs grain. À La Jaillière, le maïs s'insère dans une rotation traditionnelle de système polyculture-élevage de l'Ouest sur un sol léger (limons sur schistes).

Intervenir sur un sol friable et ressuyé

Les essais ont d'abord montré que le strip-till ne supportait pas toutes les conditions de sol. Il doit être réalisé sur un sol friable, contrairement au labour qui peut accepter une consistance semi-plastique.

Un seul passage de strip-till au printemps peut entraîner un émiettement insuffisant.

Cet impératif tient aux pièces travaillantes utilisées (chasse-débris, disques gaufrés...) qui ne peuvent plus assurer leurs missions en conditions humides. Or celles-ci

Levées : l'écart se résorbe entre strip-till et labour au fil des ans




Figure 1 : Pourcentage de levées du maïs pour les essais de Lyon St-Exupéry (69) et la Jaillière (44).

Des améliorations dans la mise en œuvre du strip-till entre 2011 et 2012 expliquent en partie les meilleures levées obtenues.

sont multiples : l'unité nettoie la ligne de semis, la fissure, mélange les débris végétaux à la terre, rappeut le sol et crée de la terre fine pour un lit de semences satisfaisant. Il est donc recommandé d'intervenir à l'automne dès la mi-octobre, ou d'attendre que le sol soit ressuyé au printemps pour éviter que la terre soit collante.

Les fenêtres d'intervention fluctuent selon le type de sol et la date de semis du maïs. Lorsqu'elle est précoce (15 mars au 10 avril), un seul passage de strip-till au printemps peut entraîner un émiettement insuffisant. Dans ce cas, un travail anticipé dès l'automne suivi ou non d'une reprise superficielle est préférable. *A contrario*, un semis plus tardif offre davantage de latitude dans le choix des dates d'intervention, le sol étant dans un état de ressuyage plus satisfaisant.

Gollainville : des écarts de rendement qui se réduisent entre techniques en 2012




Figure 2 : Rendement du maïs selon les techniques d'implantation mises en œuvre à Gollainville (45). Pour chaque essai élémentaire, les lettres situées au-dessus des histogrammes correspondent aux groupes homogènes du test de Newman-Keuls au seuil de 5 % : les modalités sont statistiquement différentes si elles n'ont aucune lettre en commun.

Les écarts entre techniques sont faibles en 2012 comparativement à 2011 alors que le rendement de référence est passé de 122,5 à 130,2 q/ha.

En sol léger, un passage à l'automne est déconseillé sous peine de prise en masse de la bande travaillée. En revanche, en cas de semis tardif, un passage unique, dissocié ou combiné au semis, est efficace.

Un net écart, de l'ordre de 10 000 pieds/ha, est apparu entre le labour et le semis direct.

Le Rotasemis est un outil rotatif à axe horizontal réalisant un travail bien émietté.

Réussir la levée

Par ailleurs, les essais ont montré que le strip-till donnait de meilleurs résultats dès lors que son passage laissait un sol bien rappuyé et émietté. Deux paramètres ont été surveillés : la qualité de la levée et le rendement final.

En maïs, une levée synchrone et un peuplement suffisant sont des incontournables pour la réussite de la culture. Sa capacité de compensation est limitée par rapport aux céréales à paille et des compétitions importantes entre pieds existent en cas de levées échelonnées. De fait, le nombre de plantes par hectare est une des composantes primordiales du rendement du maïs.



Trouver le bon créneau en sols intermédiaires

À Gollainville, le maïs est implanté après un couvert végétal totalement détruit lors du semis. La gestion des résidus pose donc peu de problèmes. Les différents modes de travail du sol se sont plutôt distingués par le niveau d'émiettement de la ligne de semis. Un net écart, de l'ordre de 10 000 pieds/ha, est apparu entre le labour et le semis direct en 2011 comme en 2012. Les trois modalités de strip-till mises



© R. Legère, ARVALIS-Institut du végétal

en place sur ce site se sont positionnées entre ces deux extrêmes (*encadré*). En 2011, les levées plutôt rapides, du fait d'un mois d'avril chaud, ont rapproché le strip-till des bons taux obtenus avec le labour, alors qu'en 2012, les levées très lentes l'ont pénalisé.

Au sein des trois modalités en strip-till, la préparation au Rotasemis, qui produit un lit de semence plus fin, s'est démarquée légèrement de celles obtenues avec les strip-tillers Striger et Jammet. Difficile pour autant de préconiser cet outil tant son débit de chantier (3-4 km/h) est aujourd'hui rédhitoire. Ces résultats plaident toutefois pour une combinaison de passages incluant du travail d'automne « relativement grossier » susceptible d'évoluer au cours de l'hiver, et une reprise très superficielle lors du printemps pour des cultures à semis précoces et très exigeantes vis-à-vis du lit de semences. Mais trouver le créneau optimal en sol intermédiaire reste une des difficultés.

Monoculture : travailler sur des parallèles annuelles

Dans l'essai de Lyon mené en monoculture et sur des sols très légers, les levées sont apparues systématiquement pénalisées en strip-till par rapport au labour : de -5 à -10 % selon les années (*figure 1*). En fait, le passage de l'outil a lieu environ un mois avant

En cas de précédent prairie, un passage unique de strip-till (à gauche) peut ne pas suffire.

Rendements : pas d'écart significatif entre strip-till et labour en 2012 à La Jaillière




Figure 3 : Rendement du maïs selon les techniques d'implantation mises en œuvre à Lyon St-Exupéry (69) et La Jaillière (44). Pour chaque essai élémentaire, les lettres situées au-dessus des histogrammes correspondent aux groupes homogènes du test de Newman-Keuls au seuil de 5 % : les modalités sont statistiquement différentes, si elles n'ont aucune lettre en commun, ou non différentes (NS).

En 2012, le site de Lyon a été la cible de corbeaux. Ils se sont focalisés sur la modalité strip-till (jusqu'à 15 % de pertes) et ce, bien après la levée. Le phénomène est *a priori* accentué par les dispositifs expérimentaux en micro-parcelles à tel point qu'il est impossible d'en exploiter les données de rendement.

le semis et la gestion des résidus de maïs peut poser problème. La présence importante de résidus génère des défauts de contact entre le sol et la graine au moment du semis si les bandes de travail ne sont pas parallèles à la ligne de semis de l'année précédente, qu'il y ait ou non mulchage. Travailler de biais ou même à la perpendiculaire de l'année précédente constitue une erreur à ne pas commettre.

Le strip-till peu efficace sur un précédent prairie

À la Jaillière, les différentes modalités ont donné des résultats similaires quant aux levées du maïs car les sols limoneux ne posent pas de problèmes de terre fine (*figure 1*). En 2012, l'implantation du maïs après un strip-till n'a pas été perturbée par le couvert végétal mis

Des inégalités d'émiettement

Dans l'essai de Gollainville, plusieurs types de strip-tillers ont été testés : Jammet, Striger et Rotasemis. Équipé de dents fines, le Jammet réalise uniquement un travail de fissuration. Le Striger, avec des dents plus larges, bouleverse davantage le sol. Quant au rotasemis, il présente la particularité d'être animé par la prise de force pour un travail superficiel (à 8 cm maximum).

Des échantillons de terre ont été prélevés juste avant le semis pour mesurer la granulométrie du lit de semences obtenu après chaque strip-tiller (figure 4). Leur analyse révèle un manque de terre fine pour les strip-tillers Jammet et Striger en 2011 : ils génèrent au mieux 40 % d'agrégats de moins de 1 cm. De leur côté, les outils animés comme le Rotasemis et la herse rotative (utilisée après un labour) s'en sortent beaucoup mieux, avec 70 % de mottes inférieures à 1 cm. En 2012, la tendance globale a été beaucoup moins marquée avec une préparation sur labour moins satisfaisante d'où des écarts plus faibles. Malgré tout, le Jammet produit un peu moins de terre fine que ses concurrents travaillant en bandes (Striger et Rotasemis).

Dans le cas d'un passage unique, il n'est donc pas toujours évident que le travail réalisé soit suffisamment émietté. Pour l'améliorer, il suffit parfois d'augmenter la vitesse d'avancement. Mais ce levier n'a pas pu être utilisé avec le modèle Jammet testé car il n'était pas équipé de disques encadrant la dent. Sinon, un passage de rouleau après le strip-till ou bien encore une adaptation artisanale de pièces travaillantes supplémentaires peuvent constituer d'autres voies d'amélioration.

Gollainville : le rotasemis produit plus de terre fine




Figure 4 : Proportion d'agrégats inférieurs à 1 cm exprimée en % de la masse totale des échantillons prélevés après le strip-till – essai de Gollainville en 2011 et 2012.

en place après le blé tendre. En revanche, la situation s'est avérée plus délicate en 2011 sur un précédent prairie. Son système racinaire fasciculé a créé des touffes et un sol creux, ce qui s'est traduit par un manque de rappui de l'élément semeur. Cette difficulté peut également survenir sur maïs après une culture en dérobé. Pour surmonter ce problème, le semoir monograine a été changé au profit d'un modèle intégrant un système d'enterrage à l'américaine avec des éléments semeurs plus lourds.

Des rendements en progression

Les tendances observées avec les levées se sont vérifiées du côté des rendements (figures 2 et 3). Le strip-till a conduit à des productivités statistiquement plus faibles en 2010 et 2011 sur les sites de la Jaillièrre et de Lyon. Ces écarts sont directement liés aux difficultés relatives à l'établissement d'un bon contact sol-

En monoculture de maïs, la solution la plus efficace consiste à intercaler les bandes d'une année sur l'autre.



graine au moment du semis. Grâce aux quelques aménagements opérés entre 2011 et 2012 (changement de semoir à La Jaillièrre et travail en bandes parallèles à Lyon), les résultats du strip-till se sont améliorés : la technique ne diffère plus statistiquement de la référence labourée. Sur le site de Gollainville où les résidus ont posé peu de problème, les rendements obtenus après un strip-till se sont avérés logiquement meilleurs qu'en absence de travail du sol. En 2012, ils ont atteint sur ce site 130,2 q/ha. Les expérimentations vont se poursuivre dans les années à venir avec l'étude de la localisation de l'azote avec le strip-till. ■

Damien Brun

d.brun@arvalisinstitutduvegetal.fr

Thibaut Ray

t.ray@arvalisinstitutduvegetal.fr

Romain Légère

r.legere@arvalisinstitutduvegetal.fr

Alain Authier

a.authier@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS-Institut du végétal